

Conocephalidae Neu-Caledoniens und der Loyalty-Inseln

von

H. Karna

Wien.

Gen. **Euconocephalus** Karna.

Verbreitung: Afrika, Asien, Australien.

1. **Euconocephalus lineatipes** (Bol.).

Verbreitung: Angola, Banyures, Borneo, West-Karolinen (Yap), Australien (Queensland, Melbourne), Neu-Caledonien, Loyalty-Inseln, Fidji-Inseln, Tahiti.

Fundorte: LOYALTY-INSELN: Lifou: Nathalo 1. V. 1911, 1 ♀.

2. **Euconocephalus extensor** (Walk.).

Euconocephalus australis Bol.

Verbreitung: Penang, Pelew, Karolinen, Neu-Britannien, Australien (Queensland), Neu-Caledonien, Loyalty-Inseln, Samoa, Fidji-Inseln, Tonga (Vaovao), Gesellschafts-Inseln (Huahine).

Fundorte: NEU-CALEDONIEN: Diahot Tal 30. IV. 1911, 1 ♀; Oubatche 31. IV. 1911, 1 ♂, 2 ♀♀; Tiouaca-Tal 23. VIII. 1911, 1 ♀; Canala 3. XI. 1911, 4 ♀♀, 1 Larve; Yaté 23. III. 1912, 1 ♀.

LOYALTY-INSELN: Maré: Netché 25. XI. 1911, 1 ♀.

Lifou: Quépénéé 5. IV. 1912, 1 ♂; 19. IV. 1912, 1 ♀; 21. IV. 1912, 1 ♀; Nathalo 27. IV. 1912, 1 ♀; 1. V. 1912, 2 ♀♀.

Gen. **Coptaspis** Redtenbacher.

Verbreitung: Australien, Neu-Caledonien.

3. **Coptaspis crassinervosa** Redt.

Verbreitung: Neu-Caledonien (endemisch).

Fundorte: NEU-CALEDONIEN: Tiouaca-Tal, 23. VIII. 1911, 1 ♂, 1 Larve; Ciu 3. II. 1912, 1 ♂, 1 ♀, 1 Larve.

Gen. **Salomona** Blanchard.

Verbreitung: Indo-Australien, Oceanien.

4. **Salomona solida** (Walk.).

Salomona godetfroyi Redt.

Verbreitung: Kei-Inseln, Australien (Cap York), Karolinen (Ponape), Neu-Irland, Loyalty-Inseln, Neu-Seeland, Tonga (Vaovao).

Fundorte: NEU-CALEDONIEN: Mt Panié, Wald, 27. VI. 1911, 1 Larve; LOYALTY-INSELN: Lifou, 8. V. 1912, 1 ♀.

5. **Salomona rouxi** n. sp.

Verbreitung: Neu-Caledonien (endemisch).

Fundorte: NEU-CALEDONIEN: Mt Panié, Wald, 27. VI. 1911, 1 ♀.

Flavo-ferruginea, genubus omnibus fusco-nigris necnon tibiis anticis per totam longitudinem nigerrimis. Antennae ferrugineae, articulis binis primis nigris. Fastigium verticis angustissimum, compressum, acutum, subtus nigrum, denticulo nullo. Frons rugulosa, punctis multis et magnis impressis, cum mandibulis tota nigra. Clypeus sanguineus. Pronotum irregulariter impresso punctatum, marginibus antico et postico late nigris, lobo postico truncato (♀). Sterna omnia pallida. Elytra fusco-ferruginea, venis principalibus necnon reticulo praeradiiali pallidis, angusta, subacuminata, apicem abdominis attingentia. Femora omnia compressa pallida; anteriora in margine antico spinis 6; postice 6—7; intermedia extus 6, intus 2 basalibus; postica extus spinis 11 armata, intus inermia. Tibiae compressae. Ovipositor pallidus, leviter incurvus, femoribus posticis aequilongus. ♀.

Long. corporis	25	mm
" pronoti	6,5	"
" elytrorum	19	"
" fem. post.	15	"
" ovipositoris	15	"

Haec species nova *Salomonae frangoisi* Brongn. vicina esse videtur, sed statura minore, fastigio subtus haud dentato, fronte ac tibiis anticis nigerrimis, spinis femorum numerosioribus facillime distinguenda.

Dedicata haec species Dom. Dr. JEAN ROUX, custodi Musei Basileensis, qui eam mihi determinandam permisit.

Gen. **Xiphidion** Serville.

Verbreitung: Kosmopolitisch.

6. **Xiphidion modestum** Redt.

Verbreitung: Australien (Cap York, New-South Wales), Neu-Guinea (Peak Downs), Neu-Caledonien, Loyalty-Inseln, Lord Howe-Insel, Fidji-Inseln (Ovalaua), Samoa-Inseln, Tongatabu.

Fundorte: NEU-CALEDONIEN: Coné, 18. VIII. 1911, 1 Larve.

LOYALTY: Lifou: Quépéneé 24. IV. 1912, 1 ♂; Nathalo 1. V. 1912, 1 ♀.

Anhang.

Conocephalidae von den Neu-Hebriden und Banks-Inseln.

(Sammlung Dr. Felix Speiser.)

1. *Euconocephalus lineatipes* (Bol.).

Verbreitung: siehe oben.

Fundort: NEU-HEBRIDEN: Malekula V. 1911, 1 ♀.

2. *Euconocephalus extensor* (Walk.).

Verbreitung: siehe oben.

Fundorte: NEU-HEBRIDEN: Malekula V. 1911, 3 ♂♂, 17 ♀♀.

BANKS-INSELN: Venua Lava XII. 1911, 1 Larve.

3. *Salomona solida* (Walk.).

Verbreitung: siehe oben.

Fundorte: NEU-HEBRIDEN: Malekula, 1 ♂, 4 Larven; Aoba, 2 Larven; Espiritu Santo, 1 ♂, 2 ♀, 1 Larve, Malo 2 ♂♂, 2 ♀♀; Ambrym, 5 Larven.

BANKS-INSELN: Venua Lava. XII. 1911.

4. *Xiphidion affine* Redt.

Verbreitung: Philippinen, Aru-Inseln, Banks-Inseln, Samoa, Fidji-Inseln (Ovalaua).

Fundort: BANKS-INSELN: Venua Lava XII. 1911, 2 ♂♂, 2 ♀♀.

5. *Phisis rapax* (Redt.).

Verbreitung: Neu-Hebriden, Fidji-Inseln.

Fundort: NEU-HEBRIDEN: Ambrym. 1911, 1 ♂.